

**ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕПИДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНИХ STOLBUR ФИТОПЛАЗМОМ  
И МЕРЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
кукуруз, соја, пшеница, уљана репица и сунцокрет у плодореду**

	ако се гаји соја између њих у плодореду	ако се између њих одмара земљиште/ угар	ако се гаје једна за другом у плодореду
	<b>кукуруз</b>		
пшеница	СРЕДЊИ 6 не деле исте векторе са сојом	ВИСОК 12 присутни корови без вектора	ЕКСТРЕМНИ 16 деле истог вектора <i>Reptalus panzeri</i>
		ЕКСТРЕМНИ 16 присутни корови и вектори	
сунцокрет	СРЕДЊИ 6 не деле исте векторе са сојом	СРЕДЊИ 6 нису присутни корови ни вектори	ВИСОК 12 не деле исте векторе
		ВИСОК 12 присутни корови без вектора	
уљана репица	СРЕДЊИ 6 не деле исте векторе са сојом	СРЕДЊИ 6 нису присутни корови ни вектори	ВИСОК 12 не деле исте векторе
		ВИСОК 12 присутни корови без вектора	